

CÁNCER TESTICULAR

UNED



El cáncer de testículo es el tumor más frecuente en hombres entre los 15 y los 35 años. Después de esta edad, es poco habitual y, en general sólo supone el 1% del total de los tumores diagnosticados en varones.

Actualmente, el número de casos diagnosticados va en aumento (desconocemos la causa) aunque la mortalidad ha descendido, gracias a un tratamiento más eficaz y a su diagnóstico cada vez más precoz.

Afortunadamente, la mayoría de los pacientes se curan, incluso en aquellos casos en los que la enfermedad se presenta inicialmente ya muy avanzada.

PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO

Actualmente no se recomienda ninguna prueba diagnóstica en personas asintomáticas. La única forma eficaz de prevención secundaria es estar atento ante los signos y síntomas de alarma que se describen a continuación.

Signos y síntomas de alarma

- Aparición de un bulto en el testículo, que suele ser indoloro.
- Sensación de peso en el área genital o simplemente un aumento de tamaño del testículo.
- Crecimiento de las mamas

¿QUÉ HACER?

Ante la aparición de cualquiera de estos síntomas o si nota cualquier alteración en el área genital, consulte a su médico, a los servicios médicos de la UNED o pida cita en Urología.

Ayúdanos a cuidarte